

DELTASECT 015 RTU

Vzhled přípravku: INSEKTICIDNÍ VODNÍ SUSPENZE V MECHANICKÉM POSTŘIKOVAČI URČENÁ K PŘÍMÉMU POUŽITÍ, (RTU).

Číslo povolení: MZDR 33746/2013/SOZ

Držitel povolení, Výrobce:
SHARDA Europe B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat 142
1702 Dilbeek
Belgie

Address for correspondence: Heedstraat 58, 1730 Asse, Belgie

Distribuuje: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice

Účinná látka	: Deltamethrin
Koncentrace účinné látky	: 0,15 g/l (0,015% hm.)
Chemická rodina	: syntetické pyrethroidy
Velikost	:
Číslo šarže a datum výroby	: viz obal
Doba použitelnosti	: 2 roky od data výroby
UFI	: D50X-3804-N00J-4FMT

POUŽÍVEJTE INSEKTICIDY S OPATRNOSTÍ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ETIKETU

POUŽITÍ ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ



VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Tekutý insekticidní přípravek určený k přímému použití ve formě postřiku proti hmyzu a členovcům ve vnitřních prostorech.

Mechanismus účinku:

Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy, působí kontaktně i požerově. Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.

Účel použití:

Přípravek DELTASECT 015 RTU je určen k hubení všech vývojových stádií lezoucího hmyzu, jako švábi, mravenci, blechy, štěnice, rybenky apod., ve vnitřních prostorech obytných budov a domácností.

Návod k použití:

Před použitím přípravku DELTASECT 015 RTU nádobu několikrát důkladně protřepejte. Otevřete trysku nastavením symbolu sprej a silným opakovaným stlačováním páčky přípravek aplikujte. Proti mravencům přípravek aplikujte kolem vchodů do hnízd, na cestičky, nebo jako bariéru na místa jejich pronikání do vnitřních

prostor. Proti ostatním druhům aplikujte přípravek na všechna místa, kde se hmyz ve dne vyskytuje a vyhledává potravu, a kde se v noci ukrývá. Věnujte zvláštní pozornost všem skřím, štěrbinám, prasklinám a trhlínám, zejména v blízkosti vodovodního potrubí, kanalizačního potrubí, podlahových lišt apod.

Dávkování:

Přípravek aplikujte tak, aby všechny povrchy, které mají být ošetřeny, jím byly stejnoměrně zvlhčeny. Postřik zůstává účinný nejméně 10 dní, nesmí však být smyt, otřen, zaprášen, nebo jinak znehodnocen. Aplikujte postřikem v dávkách 50 ml přípravku na každý m² ošetřené plochy.

Bezpečnostní opatření

POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID

POUZE PRO POUŽITÍ V KRYTÝCH PROSTORECH

Před ošetřením zajistěte nepřítomnost lidí a domácích zvířat v místnostech, kde bude přípravek aplikován.

Místnosti mohou být znovu používány až po oschnutí ošetřených povrchů a po vyvětrání.

Před aplikací přípravku odstraňte z místnosti, důkladně přikryjte, nebo uschovejte do skříně potraviny, nádoby, akvária s rybami.

Nestříkejte na zařízení nebo na povrchy, které přicházejí do kontaktu s nezabalenými potravinami.

Přípravek uchovávejte pouze v těsně uzavřeném původním obalu, mimo dosah nepovolaných osob, zejména dětí.

Nestříkejte na ložní prádlo, oblečení a dětské hračky.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte cigarety.

Při práci s přípravkem zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Po použití si umyjte ruce a obličej s mýdlem a vodou.

Příznaky otravy:

Přípravek obsahuje insekticid ze skupiny pyrethroidů.

Při akutní otravě se může objevit rozrušení, gastrointestinální příznaky, třes, závratě, letargie, nevolnost a zvracení, bolest v horní části trupu, svalové záškuby končetin, křeče a bezvědomí (při zasažení velmi vysokou dávkou).

První pomoc:

Všeobecné: Při požití vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tuto nádobu nebo štítek.

Při vdechnutí: Přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud postižená osoba nedýchá, zahajte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

Při kontaktu s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Po kontaktu s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s okem: Omývejte velkým množstvím vody (po dobu aspoň 20 minut) s široce otevřenými očima a po vyjmutí měkkých kontaktních čoček, poté ihned vyhledejte lékaře.

První pomoc při požití: Vypláchněte ústa. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým informačním střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek skladujte v originálním obalu. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, na chladném, dobře větraném místě, při teplotě 0 až +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem, teplem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistěte nádoby před mechanickým poškozením.

Zneškodnění zbytků přípravku a jeho obalů:

Nevyhazujte do komunálního odpadu. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte znečištění povrchových a podzemních vod. Zbytky přípravku, přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti a prázdné obaly vraťte prodejci, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo je předejte subjektu pověřenému pro zneškodňování nebezpečných odpadů. Je zakázáno spalovat prázdné obaly.

UPOZORNĚNÍ! NEPOUŽÍVEJTE ANI VYPLÁCHNUTÉ PRÁZDNÉ OBALY PRO JINÉ ÚČELY

VYJÁDŘENÍ

Dodržujte použití, dávkování, podmínky a bezpečnostní opatření na obalu, které byly stanoveny na základě vlastností výrobku a aplikací, pro které je doporučen. Ošetření by mělo být provedeno v souladu se správnou praxí, přičemž na svou odpovědnost zohledněte všechny specifické faktory, které mohou být zahrnuty a které jsou mimo naši kontrolu (použité materiály, podmínky aplikace, směs produktů atd.). Výrobce ručí za kvalitu svých výrobků prodávaných v originálním balení.