



DISPARID®

Fly Granular Bait



500 g

Insekticidní přípravek s účinnou látkou indoxakarb ve formě granulí, určený jako nástraha proti mouchám a masařkám.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Účinná látka:

Indoxakarb 7,96 g/kg (0,796 hm. %)

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. PŘÍPRAVEK JE URČEN PRO POUŽITÍ UVNITŘ A V OKOLÍ FAREM, U HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU BROJLERŮ), V OBYTNÝCH A KOMERČNÍCH BUDOVÁCH.



Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

Varování

- H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261: Zamezte vdechování prachu.
P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / ochranný štít.
P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P321: Odborné ošetření (viz informace na tomto štítku).
P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501: Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.



Číslo povolení: CZ-0027839-0000

Jméno (název) a adresa držitele povolení: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švýcarsko

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 224 919 293, +420 224 915 402. Toxikologické informační středisko (TIS) Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

UFI: E5Q8-40TS-R007-SJPN


Číslo šarže: *Uvedeno na obalu*

Datum výroby: *Uvedeno na obalu*

Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování:

Skladujte v původním obalu na uzamčeném a suchém místě, kam nemají přístup děti. Chraňte před přímým slunečním svitem. Chraňte před teplotními extrémy. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Žádná zvláštní omezení skladování společně s jinými výrobky.

Doba skladovatelnosti: 2 roky



Údaje o mnoznych přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí:

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstraňte kontaminované oblečení a boty. Omyjte kontaminovanou pokožku mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření, jestliže podráždění přetrvává.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování vlažnou vodou po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařské ošetření, jestliže podráždění přetrvává nebo se zhorší zrak.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se vyskytnou obtíže nebo bylo polknuto větší množství.

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících příznacích nebo při vdechnutí většího množství vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě bezvědomí uložte postiženého ve stabilizované poloze a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nepodávejte žádné kapaliny a nevyvolávejte zvracení.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu:

Zbytky přípravku, jeho obal a veškerý další odpad (spotřebované nástrahové staničky, mrtvé mouchy v nástrahové staničce nebo kolem ní) zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

Nespotřebovaný přípravek nevypouštějte do půdy, vodních toků, kanalizace (dřezy, toalety...) ani do odvodňovacích stok.

Povolené použití

Použití – Odborníci

Granulovaný přípravek se používá jako nástraha pouze ve staničkách, navržených k použití s granulovanými nástrahami na kontrolu mušek v zemědělských budovách, u hospodářských zvířat (s výjimkou brojlerů), v obytných a komerčních budovách.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia):

- Moucha domácí (*Musca domestica*)
Vývojové stadium: dospělci
- Masařky (*Calliphoridae sp*)
Vývojové stadium: dospělci

Oblast použití:

Vnitřní prostory & venkovní prostředí

Používá se v a kolem zemědělských budov a u hospodářských zvířat (s výjimkou brojlerů), v obytných a komerčních budovách a kolem nich.

Metoda aplikace:

Použití ve formě nástrahy. Umisťuje se do nástrahových staniček, uvnitř a venku kolem budov. Venkovní nástrahové staničky jsou navrženy tak, aby chránily přípravek před deštěm a umísťují se na stěny nebo se zavěšují.

Návod k použití:

Před použitím si vždy přečtěte štítek přípravku a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Dodržujte doporučené dávkování.

Vyhňte se trvalému používání přípravku.

V případě opětovného zamoření opakujte aplikaci.

Vzhledem ke způsobu působení účinné látky indoxakarb může k úhynu much dojít s prodlevou až 72 hodin.

Nepoužívejte přípravek v oblastech, kde máte podezření na rezistenci vůči účinné látce (látkám) obsažené v přípravku nebo kde byla taková rezistence potvrzena.

Střídejte přípravky obsahující účinné látky s odlišným mechanismem účinku (s cílem odstranit rezistentní jedince z populace).

Zaveďte integrované způsoby regulace škůdců jako např. kombinace chemických, fyzikálních metod regulace a jiných opatření k ochraně veřejného zdraví, s ohledem na místní specifika (klimatické podmínky, cílový druh, podmínky použití atd.).

Zkontrolujte účinnost přípravku na místě: v případě potřeby je nutné zjistit příčiny snížené účinnosti s cílem ověřit, jestli se neobjevila rezistence, nebo identifikovat potenciální rezistenci.

Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

Vložte nástrahu do nástrahové staničky pomocí odměrného dávkovače.

Nepoužívejte přípravek v prostorách pro brojery nebo kolem nich.

Aplikační dávka a četnost aplikací:

Aplikační dávka / počet a načasování aplikace: 40 g přípravku na staničku, 1 stanička s nástrahou / 20 m² (2 g/m²).

Ošetřené oblasti je nutné opětovně kontrolovat každý týden. Pokud byla nástraha zcela spotřebována a aktivita přetrvává, je nutné provést druhou aplikaci.

Ředění (%): Nemí vyžadováno

Kategorie uživatelů:

Odborníci

Velikost balení a obalový materiál:

DISPARID Fly Granular Bait se dodává jako volně ložený materiál.

Materiál je balen následovně:

- HDPE láhev (1 l)
- PP kbelík (5 l)

Opatření ke zmírnění rizik:

Používejte nástrahové staničky, které jsou specificky navrženy s cílem zabránit uvolnění granulované nástrahy a jakékoli expozici necílových zvířat. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud existuje riziko přístupu dětí, domácích zvířat a necílových zvířat k nástrahovým staničkám, je nutné použít nástrahové staničky, odolné vůči manipulaci.

Nástrahové staničky je nutné umístit na stěnu nebo zavěsit – nepokládat na zem.

Při venkovním použití musí být nástrahové staničky odolné vůči manipulaci, navržené tak, aby nástrahu ochránily před deštěm a musí být umístěny v oblastech chráněných před vlhkem a mimo dosah necílových zvířat.

Při vnitřním použití musí být jednoduché nebo vůči manipulaci odolné nástrahové staničky umístěny mimo cesty a/nebo hnojiště, mimo dosah necílových zvířat a v oblastech chráněných před vlhkem.

Nástrahové staničky ani dávkovač nečistěte vodou.

Při manipulaci s a/nebo aplikaci přípravku používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (Nitrilový kaučuk).

Zabraňte kontaktu kontaminovaných nástrojů a předmětů s kůží a očima.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv a mimo nádoby nebo povrchy, které s nimi přicházejí do kontaktu.

Všechny nástrahové staničky musí být před čištěním a/nebo dezinfekcí hospodářských, obytných a komerčních budov odstraněny.

Další informace:

Tento přípravek obsahuje hořké činidlo.



DISPARID®
Fly Granular Bait



500 g

Insekticidní přípravek s účinnou látkou indoxakarb ve formě granulí, určený jako nástraha proti mouchám a masařkám.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Účinná látka:
Indoxakarb 7,96 g/kg (0,796 hm. %)

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. PŘÍPRAVEK JE URČEN PRO POUŽITÍ UVNITŘ A V OKOLÍ FAREM, U HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU BROJLERŮ), V OBYTNÝCH A KOMERČNÍCH BUDOVÁCH.

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

Varování

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261: Zamezte vdechování prachu.

P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / ochranný štít.

P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P321: Odborné ošetření (viz informace na tomto štítku).

P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P501: Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.



Číslo povolení: CZ-0027839-0000

Jméno (název) a adresa držitele povolení: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švýcarsko

Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 224 919 293, +420 224 915 402. Toxikologické informační středisko (TIS) Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

UFI: E5Q8-40TS-R007-SJPN

Číslo šarže: *Uvedeno na obalu*

Datum výroby: *Uvedeno na obalu*

Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování:

Skladujte v původním obalu na uzamčeném a suchém místě, kam nemají přístup děti. Chraňte před přímým slunečním svitem. Chraňte před teplotními extrémy. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Žádná zvláštní omezení skladování společně s jinými výrobky.

Doba skladovatelnosti: 2 roky

