



DISPARID®
granuloovaná nástraha

Elanco

TM

POUŽÍVEJTE **DISPARID!** PRO EFEKTIVNÍ KONTROLU MUCH



DŮLEŽITOST EFEKTIVNÍ KONTROLY MUCH

Mouchy způsobují stres a neklid. Na neustálé odhánění much zvířata spotřebují spoustu energie, což může vést k nižšímu využití krmiva a tím ke snížení užitkovosti.¹

Mouchy mohou být také přenašeči patogenů, jako jsou viry, bakterie, houby a paraziti.¹ Efektivní hubení much, jako součást biosekurity, hraje klíčovou roli ve snižování negativních dopadů.

Návod k použití Disparidu:

Disparid (Indoxacarb) – granulovaný přípravek k hubení dospělců mouchy domácí (*Musca domestica*) a dospělců bzučivek (*Calliphoridae* sp.).

Návod k použití nástrahy v lapači

- ▶ Umístění uvnitř i venku.
- ▶ V zemědělských nebo chovatelských objektech/stavbách a v jejich okolí (kromě chovu drůbeže).
- ▶ V obytných a komerčních objektech/stavbách a v jejich okolí.

Umístění lapačů

- ▶ Lapače jsou navrženy tak, aby při venkovním použití chránily nástrahu před deštěm.
- ▶ Lapače s nástrahou musí být umístěny nad zemí, připevněny na stěnu nebo zavěšeny.
- ▶ Lapače s nástrahou, ani dávkovací pomůcky, nečistěte vodou.

Aplikace:

40 g přípravku na jeden lapač / 20 m²
(odpovídá 2 g/m²)
Ředění (%): 0,0



Frekvence a načasování aplikace:

Ošetřené plochy by měly být každý týden znovu zkontrolovány. Pokud byla nástraha zcela spotřebována a mouchy jsou stále aktivní, měla by být provedena druhá aplikace.

Vzhledem k mechanismu účinku Indoxacardu může být úhyn much opožděn až o 72 hodin





DISPARID®

granuloovaná nástraha

Balení

- ▶ Láhev, 500 g, HDPE

Přípravek uchovávejte v temnu.

Doba použitelnosti - dva roky.

Zvláštní opatření při používání

- ▶ Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- ▶ Díky dlouhodobému účinku je škodlivý pro vodní organismy.

Zvláštní opatření

- ▶ Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu. Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být vynášen z pracoviště.
- ▶ Zabraňte úniku do životního prostředí.
- ▶ Používejte ochranné pomůcky (rukavice, oděv, brýle, štít).
- ▶ V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte postižené místo důkladně mýdlem a vodou.
- ▶ Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Specifická léčba (dle pokynů lékaře).
- ▶ Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- ▶ Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý ostatní odpad (spotřebované návnady, mrtvé mouchy v lapačích a v jeho okolí) likvidujte v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nevysypávejte nepoužitý přípravek do půdy, do vodních toků, do potrubí (umyvadla, toalety...), ani do kanalizace.

Pro profesionální použití.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte návod a informace o přípravku.

Reference:

1 Reissert-Oppermann, S., Hildebrand, J., Jandowsky, A., Steuber, S., Bauer, B., Clausen, P. 2020. Insektizidresistenzen bei Stubenfliegen (*Musca domestica*) und Wadenstechern (*Stomoxys calcitrans*), Tierärztliche Umschau. Ausgabe 1-2/2020.



DŮLEŽITÉ

- ▶ Začněte s ošetřením včas, na začátku sezóny much.
- ▶ Pokud byla nástraha zcela spotřebována a mouchy jsou stále aktivní, měla by být provedena druhá aplikace.
- ▶ **Vzhledem k mechanismu účinku Indoxacaru může být úhyn much opožděn až o 72 hodin.**