

EKOLIST Vápník (Proti nedostatku vápníku)			
Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.			
KFV 1(C)(I)(b)(ii): VÍCESLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI Roztokové hnojivo s N (8) Ca;Mg (13,9-2) a stopovými prvky			
Složení (% m/m) 8 % celkový dusík (N), z toho: 8 % dusičnanový dusík (NO ₃) 13,9 % oxid vápenatý (CaO) rozpustný ve vodě 2 % oxid hořečnatý (MgO) rozpustný ve vodě 0,020 % - bor (B) ve formě kyseliny borité rozpustný ve vodě 0,030 % - měď (Cu) v chelátu s EDTA rozpustná ve vodě 0,020 % - železo (Fe) v chelátu s EDTA rozpustné ve vodě 0,010 % - mangan (Mn) v chelátu s EDTA rozpustný ve vodě 0,001 % - molybden (Mo) ve formě amonné soli rozpustné ve vodě 0,030 % - zinek (Zn) v chelátu s EDTA rozpustný ve vodě			
Rozmezí pH zaručující přijatelnou stabilitu: 2,1 - 4			
Složky: dusičnan vápenatý nr CAS: 10124-37-5 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), hexahydrát dusičnanu hořečnatého nr CAS: 13446-18-9 (KSM 1)			
Použití: Výrobek je určen pro hnojení ovoce, zeleniny a zemědělských plodin vápníkem. Díky formuli EXPRES Ca je vápník rostlinami rychle vstřebáván a transportován do cílových orgánů – to pomáhá eliminovat příčiny takových jevů, jako je hořká skvrnitost nebo odumírání špičky. To má pozitivní vliv na kvalitu úrody a její skladovatelnost.			
Dávkování: Možnost aplikace: postřikem nebo závlivkou			
Rostlina	Termín ošetření	Dávka (ml/100m²)	Počet aplikací
Jabloň	Od fáze velikosti plodů do 10 mm (BBCH 71) každých 10-14 dní až do 2 týdnů před sklizní.	30-80 ml / 4-10 l vody	3-6
	Množství postřiku by mělo být přizpůsobeno požadavkům odrůdy a plánované době skladování. Používejte nižší dávky hnojiva v raných fázích růstu stromů a vyšší v pozdějších fázích.		
Ovocné stromy a keře	Od začátku růstu pupenů každých 7-10 dní.	30-50 ml/ 4-10 l vody	3-4
Jahodník a bobulovité rostliny	Konec kvetení (BBCH 67).	30-40 ml/ 2-3 l vody	3
Rajče, paprika a okurka	Po výsadbě sazenic nebo 2–3 týdny po vyklíčení každých 7 dní – dvě ošetření (BBCH 12–13).	10-30 ml/ 2-3 l vody	3-5
	Od okamžiku, kdy plody vadnou, každých 5-10 dní.		
	U plodin pod krytem (skleníky, fóliovníky) 50-100 ml na 10 l tekutiny		
Brukvovitá zelenina (zelí, květák, brokolice,	Po výsadbě sazenic – fáze 6 listů (BBCH 12–15). Fáze intenzivního vegetativního růstu	30-50 ml/ 2-3 l vody	3-5

kedlubny, kapusta)	hlav každých 10-14 dní (BBCH 41-49).		
Kořenová zelenina (mrkev, petržel, ředkvička, červená řepa, celer)	Růst listů stimulace normálního růstu (BBCH 13–19).	20-40 ml/ 2-3 l vody	2-3
Okrasné rostliny a ostatní	Ve fázích intenzivního růstu.	10-20 ml/ 4-10 l vody	1-3

Poznámky ke konkrétním doporučením k používání:

Používejte pouze v odůvodněných případech. Nepřekračujte doporučenou dávku

Ošetření provádějte ráno nebo večer při maximální teplotě 25 °C. Minimální teplota postřiku 10°C.

Při vyšších teplotách vzduchu (zejména kolem poledne při teplých dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin.

CHCETE-LI HNOJIVO KOMBINOVAT S JINÝM PROSTŘEDKEM, ZKUSTE PŘÍPRAVKY SMÍCHAT A OVĚŘIT REAKCI ROSTLIN NA SMĚS.

Jedná se o obecná doporučení. Chcete-li získat podrobnější informace, kontaktujte výrobce.

www.ekoplون.pl

Pro jednotlivé registrované plodiny postačí aplikovat v uvedených termínech.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:

Přímo před postřikem (zálivkou) naplňte nádobu do 2/3 objemu, pak postupně přidávejte hnojivo Ekolist Vápník Proti nedostatku vápníku a vše míchejte. Doplňte vodou do stanoveného objemu a vše zamíchejte. Proveďte postřik (zálivku).

Pokyny pro skladování a dopravu:

Skladujte v suchu, mimo dosah tepla a slunce.

Trvanlivost – 3 roky od data výroby



Bezpečnostní a ekologické informace:

Abyste předešli rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, dodržujte pokyny pro doporučené použití. Uchovávejte mimo dosah dětí, v původním uzavřeném obalu.

Výrobek je klasifikován podle nařízení ES 1272/2008

V souladu s EC 1272/2008

EKOLIST Vápník

Obsahuje: dusičnan vápenatý (CAS: 10124-37-5)



Nebezpečí!

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Prevence:

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 – Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

P270 – Při používání tohoto produktu nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce:

P301 + P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Skladování:

P405 – Skladujte uzamčené.

Likvidace:

P501 – Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

KOD UFI: CE20-Y0UG-V00Q-A53J

Evidenční číslo: C317

PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Výrobce:

Ekoplón sp. z o.o. sp.k.
Grabki Duże 82
28-225 Szydłów, Polsko

Distributor v ČR / držitel registrace:

Victus LA s.r.o.
Těšínská 551/329
71600 Ostrava
IČ: 26856441

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení na trhu:

AgroBio Opava, s.r.o.
Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice
Tel.: +420 553 626 660

Velikost balení: 250 ml, HDPE láhev se šroubovým uzávěrem

Nedostatek přijatelného vápníku způsobuje u zeleniny suchou hnilobu konců plodů. Tento problém se vyskytuje především u rajčete, papriky nebo okurky. Nedostatek vápníku u jabloní způsobuje hořkou skvrnitost (pihovitost).

Číslo šarže, datum výroby: uvedeno na obale