

Přípravek na ochranu rostlin

INPORO PelarDown koncentrát

Pro neprofesionální uživatele

Herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), jehož vodný roztok je určen k rychlé a trvalé likvidaci plevelů a travin. Likviduje i mechy a řasy.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Název a množství účinné látky: kyselina pelargonová 186,7 g/l (18,8 % hmot.)

Označení přípravku:



Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

UFI: RYDR-R03C-CQ0R-4GXX

Držitel rozhodnutí o povolení: W. Neudorff GmbH, KG, An der Mühle 3, D - 31860 Emmerthal, Německo

Právní zástupce v ČR: Zuzana Pavelková, Janovská 394, 109 00 Praha 10
tel.: +420 604 182 947

Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na trhu:
W. Neudorff GmbH KG

Evidenční číslo přípravku:

Datum výroby formulace/Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby, teplota skladování + 5 °C až + 30 °C

Balení: 250 ml, 500 ml, 1000 ml láhev HDPE se šroubovacím uzávěrem a 5 l kanystř HDPE se šroubovacím uzávěrem

Množství přípravku v obalu: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l

Působení přípravku:

INPORO PelarDown RTU je totální herbicid s účinnou látkou kyselinou pelargonovou, jednou z mastných kyselin, která se běžně vyskytuje v přírodě a působí na četné úporné plevely a účinek je patrný již za jeden den po aplikaci.

Rozsah povoleného použití: INPORO PelarDown koncentrát

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) pozn. k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
cesty a neobdělávaná prostranství pod dřevinami	plevely jednoděložné, plevely dvouděložné	100 ml 0,5 l vody/ 6 m ² plochy	-		4) max. 8x za rok
nepropustné půdní povrchy	plevely jednoděložné, plevely dvouděložné	100 ml 0,5 l vody/ 6 m ² plochy	-		4) max. 8x za rok
okrasné dřeviny, okrasné rostliny	plevely jednoděložné, plevely dvouděložné	100 ml 0,5 l vody/ 6 m ² plochy	-		4) max. 4x za rok
cesty a neobdělávaná prostranství pod dřevinami	mechy, řasy	100 ml 0,5 l vody/ 6 m ² plochy	-		4) max. 4x za rok

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cesty	0,5 l	postřik	8x za rok, jaro - podzim	21 dnů
nepropustné půdní povrchy	0,5 l	postřik	8x za rok, jaro - podzim	21 dnů
okrasné dřeviny, okrasné rostliny	0,5 l	postřik	4x za rok, jaro - podzim	21 dnů

Upřesnění použití:

Aplikujte nezávisle na růstové fázi.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: pampeliška lékařská, jitrocel větší, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, pcháč oset, mléč

Plevele méně citlivé: pýr, lipnice

Teploty pod 15 °C a srážky do 12 hod. po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Další omezení:

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Opětovný vstup na ošetřované plochy je možný po zaschnutí přípravku.

Není povoleno ošetřenou travu zkrmovat zvířaty.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové rukavice nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana těla: ochranný oděv

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky)

Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo požitím) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/ nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlaheé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.

Další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Skladujte mimo dosah dětí v původních obalech při teplotě + 5 °C až + 30 °C, odděleně od nápojů, potravin, krmiv pro zvířata. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Likvidace obalů a zbytků

Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se naředí 1 : 5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. Zbytky nespotřebovaného přípravku musí být zneškodněny bezpečným způsobem, předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Prázdné obaly od přípravku se předají do sběru k recyklaci nebo se likvidují jako komunální odpad. Přípravek ani vyprázdněné obaly nesmějí přijít do vodotečí nebo do kanalizace.

Další údaje a upřesnění:

Příprava aplikační kapaliny: Před upotřebením protřepat. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Odměrka se plní středovou rourkou při stisknutí nádoby. Jakmile se naplní do požadované výše, uvolněte stisk. Při plnění ponechte na odměrce kryt jako ochranu před vystříknutím kapaliny. Při vylévání obsahu odměrky držte nádobku za okraje, abyste ji omylem nestiskli. Odšroubujte uzávěr, který je i odměrka a odřízněte nožem špičku stříkacího uzávěru. Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do jedné čtvrtiny až třetiny vodou a po důkladném promíchání se za stálého míchání doplní na stanovený objem.

Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci je nutné zajistit účinné míchání.

Čištění aplikačního zařízení:

Po aplikaci přípravku vypláchnout aplikační zařízení čistou vodou. V případě použití čisticích prostředků, postupujte dle návodu na jejich použití.

Upřesnění:

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými ručními nebo zádonými postřikovači. Plevel je nutno cíleně a intenzívně postříkat – odumírají jen zasažené části rostlin. Rostliny musí být v době postřiku suché. Aplikuje se buď cíleně na jednotlivé rostliny nebo na zaplevelenou plochu.

Tento přípravek není vhodný k likvidaci plevelů v trávníku, protože všechny zasažené zelené části rostlin odumírají.

Přípravek je možno používat na terasách, cestách i v zahradě. Přípravek nezanechává žádné skvrny na většině druhů kamenů. Pokud jde o mimořádně citlivé materiály, jako jsou například barevné pískovce nebo umělé pryskyřice, doporučuje se aplikaci nejdříve vyzkoušet na nenápadném místě a zjistit, jestli se ani v tomto případě neobjeví skvrny. Plochy, které byly ošetřeny přípravkem proti plevelům, se nemají alespoň jeden den zpracovávat, aby se mohlo plně uplatnit jeho působení. Potom se půda může opět obdělávat a osít nebo osázet.

Balení 500 ml vystačí až na 90 m² zaplevelené plochy. Aplikuje se buď cíleně na jednotlivé rostliny nebo na zaplevelenou plochu. Při cíleném postřiku obvykle vystačí 30 – 40 ml/m².

Zaručujeme kvalitu našich výrobků prodávaných v originálním obalu. Za škody vzniklé neodbornou nebo zakázanou aplikací či skladováním neručíme.