

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Advion Ant Gel

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců  
(Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců  
(Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců  
(Regulace živočišných škůdců)

**Číslo povolení:** CZ-0021239-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0021239-0000

## Obsah

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Administrativní informace                                                                               | 1  |
| 1.1. Obchodní název přípravku                                                                           | 1  |
| 1.2. Držitel povolení                                                                                   | 1  |
| 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků                                                             | 1  |
| 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek                                                           | 1  |
| 2. Složení přípravku a jeho typ složení                                                                 | 2  |
| 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product                | 2  |
| 2.2. Typ složení přípravku                                                                              | 2  |
| 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení                                      | 2  |
| 4. Povolené(á) použití                                                                                  | 3  |
| 5. Obecná pravidla pro používání                                                                        | 13 |
| 5.1. Pokyny pro používání                                                                               | 13 |
| 5.2. Opatření ke zmírnění rizika                                                                        | 13 |
| 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy | 13 |
| 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu                                              | 13 |
| 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování                | 13 |
| 6. Další informace                                                                                      | 13 |

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

Advion Ant gel  
Gel na mravence Advion

### 1.2. Držitel povolení

|                                            |                 |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Jméno (název) a adresa držitele povolení   | Jméno (název)   | Syngenta Crop Protection AG             |
|                                            | Adresa          | Rosentalstrasse 67 4058 Basel Švýcarsko |
| Číslo povolení                             | CZ-0021239-0000 |                                         |
| Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3 | CZ-0021239-0000 |                                         |
| Datum udělení povolení                     | 28/10/2011      |                                         |
| Datum skončení platnosti povolení          | 30/06/2024      |                                         |

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Název výrobce             | American Blending and Filling Laboratories Inc   |
| Adresa výrobce            | 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Spojené státy |
| Umístění výrobních závodů | 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Spojené státy |

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

**Účinná látka**

64 - Indoxakarb (reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25)

**Název výrobce**

Syngenta Crop Protection AG

**Adresa výrobce**

Schwarzwaldallee 215 4058 Basel Švýcarsko

**Umístění výrobních závodů**

Mobile Manufacturing Center, Highway 43 36505 Alabama Spojené státy

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

| Obecný název                                                   | Název podle IUPAC                                                                                                                                                                                                                                       | Funkce       | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Indoxakarb (reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25) | Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers) | účinná látka |           |          | 0,05      |

### 2.2. Typ složení přípravku

RB - Nástraha k přímému použití

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

**Standardní věty  
o nebezpečnosti****Pokyny pro bezpečné  
zacházení**

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Široká veřejnost

##### Typ přípravku

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

##### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

VII.2 Ochrana zdraví - Insekticidní přípravek s účinnou látkou indoxacarb ve formě gelu v nástrahové staničce určený k regulaci populace mravenců.

##### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: mravenec obecný (Lasius niger)  
Vývojové stadium: Žádné informace

##### Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Pro použití v interiéru i exteriéru.  
Přípravek je určen pro použití ve vnitřních prostorách a přilehlém okolí obytných budov, na terasách a zahradách širokou veřejností.

##### Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě nástrahy

Podrobný popis:

Použití ve formě nástrahy. Nástraha k přímému použití je umístěna v nástrahové staničce.

##### Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: 1-5 nástrahových staniček na 40 m<sup>2</sup>

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

1 - 5 nástrahových staniček na 40 m<sup>2</sup> do míst, kde jsou mravenci aktivní (max. aplikační dávka: 0,5 g gelové nástrahy na m<sup>2</sup>).

Nástrahovou staničku vyměňte nejdříve za 7 dní.

##### Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

## Velikost balení a obalový materiál

Plastová (PET,EVOH/PE) nástrahová stanička v tepelně uzavřené fólii obsahující: 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 a 6 gramů gelové nástrahy.

### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Před položením nástrahové staničky určete místa aktivity mravenců a stanovte rozsah zamoření. Nástrahovou staničku umístěte v blízkosti mravenišť, přímo na mravenčí stezky nebo na další místa, kde je zvýšený výskyt mravenců či na místa, kde se předpokládá možný zvýšený výskyt mravenců. Přípravek se také aplikuje na místa vstupu škůdců do obytných prostor, do podkroví, do otvorů ve zdech, za skříně a jiná zařízení, za lišty či podél potrubí.

Odstraňte všechny možné zdroje potravy, které jsou pro škůdce snadno dosažitelné.

Venkovní použití (terasy, vstupní prostory a zahrady): umístěte nástrahové staničky do míst, kde je nejpravděpodobnější výskyt mravenců: okapy, římsy, místa vstupu potrubí a drátů do konstrukce budov.

Na konci období ošetření odstraňte nástrahové staničky a bezpečně zlikvidujte, viz kapitola 4.1.4.

### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nástrahové staničky neotvírejte a s gelovou nástrahou nemanipulujte.

Přípravek se používá pouze v prostorách nepřístupným dětem, domácím zvířatům a necílovým organismům.

Nepoužívejte v prostorách, kde mohou do styku s přípravkem přijít potraviny nebo krmiva, potravinářské náčiní nebo povrchy pro zpracování potravin, nebo může dojít k jejich kontaminaci.

Při venkovním použití přípravek aplikujte pouze na plochy, které nejsou omývány vodou nebo deštěm.

Při použití kolem budov nepokládejte nástrahové staničky do nebo v blízkosti odpadů či kanalizace.

### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Zamezte zasažení pokožky, očí či oděvu.

Po manipulaci s přípravkem se důkladně umyjte vodou a mýdlem.

Při styku s kůží: Omyjte kůži vodou.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

**Opatření na ochranu životního prostředí:**

Zamezte úniku přípravku do povrchových vod a kanalizace. Přípravek ani jeho obaly nesmí kontaminovat rybníky, vodní toky a příkopy.

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Případné úniky utřete pomocí papírové utěrky. Odstraňte nespotřebovaný přípravek a materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Prázdné nástrahové staničky nedoplňujte ani znovu nepoužívejte.

**Katalogové číslo odpadu EWC:**

20 01 19\* Pesticidy

15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

viz kapitola 5.5.

## 4.2 Popis použití

### Použití 2 - Profesionální použití - spáry, štěrby, bodová ošetření

#### Typ přípravku

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

#### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

VII.2 Ochrana zdraví - Insekticidní přípravek s účinnou látkou indoxacarb ve formě gelu určený k regulaci populace mravenců.

#### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: mravenec obecný (*Lasius niger*)  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: mravenec faraón (*Monomorium pharaonis*)  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: mravenec argentinský (*Linepithema humile*)  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: mravenec (*Tapinoma malenocephalum*)  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: *Paratrechina longicornis*  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: *Pheidole megacephala*  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: *Myrmica rubra*  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: *Crematogaster* spp  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:  
Obecný název: *Tetramorium* spp a *Camponotus* spp  
Vývojové stadium: Žádné informace

#### Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Pro použití v interiéru i exteriéru: ošetření spár, štěrbin a bodové ošetření. Přípravek je určen pro použití ve vnitřních prostorách a přilehlém okolí obytných budov, kanceláří, průmyslových a komerčních objektů, skladů a veřejných prostor (kuchyně, nemocnice, školy, sociální zařízení, hotely, letiště).

#### Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě nástrahy.  
Podrobný popis:

#### Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Použití ve formě nástrahy. Nástraha k přímému použití v předem naplněné stříkačce.

Míra aplikace: 1 - 5 bodových ošetření na m2 nebo až 5 cm tenká vrsta na každý aplikační bod.

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Přípravek je aplikován prostřednictvím předem naplněné stříkačky pouze v prostorách nepřístupným dětem, domácím zvířatům a nečlověkem organismům.

Aplikujte 1 - 5 gelových bodů na m2 nebo až 5cm tenkou vrstvu na každý aplikační bod.

Přípravky v předem naplněných stříkačkách:

Bod o průměru 5 mm obsahuje cca 0,1 g přípravku.

Bod o průměru 1 cm obsahuje cca 0,5 g přípravku.

Tenká 5cm vrstva o šířce 0,3 cm obsahuje cca 0,4 g přípravku.

#### Kategorie uživatelů

profesionál

#### Velikost balení a obalový materiál

Stříkačka (tuba), plast (HDPE), 5 g, 10 g, 20 g, 30 g

Přípravek se dodává v předem naplněných plastových tubách s tryskou a pístem s 30 g gelové nástrahy, tuba je opatřena šroubovacím uzávěrem. Tuby se dodávají v balení po čtyřech kusech.

Předem naplněné plastové tuby obsahující 5 g, 10 g, 20 g a 30 g gelové nástrahy se šroubovacím uzávěrem dodávají samostatně.

#### 4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Před položením nástrahové staničky určete místa aktivity mravenců a stanovte rozsah zamoření.

Přípravek se také aplikuje na místa vstupu škůdců do obytných prostor, do podkroví, do otvorů ve zdech, za skříně a jiná zařízení, za lišty či podél potrubí.

Odstraňte všechny možné zdroje potravy, které jsou pro škůdce snadno dosažitelné.

Přípravek je aplikován prostřednictvím předem naplněné stříkačky pouze v prostorách nepřístupným dětem, domácím zvířatům a necílovým organismům.

V potravinářských nebo krmivářských provozech lze přípravek aplikovat pouze do spár a štěrbin.

Přípravek lze aplikovat také vložením do nástrahových staniček nebo podobných zařízení s cílem zajistit ochranu před přístupem dětí, domácích zvířat a necílových živočichů.

#### 4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nemanipulujte s gelovou nástrahou.

Přípravek se používá pouze v prostorách nepřístupným dětem, domácím zvířatům a necílovým organismům.

Nepoužívejte v prostorách, kde mohou do styku s přípravkem přijít potraviny nebo krmiva, potravinářské náčiní nebo povrchy pro zpracování potravin, nebo může dojít k jejich kontaminaci.

Při venkovním použití přípravek aplikujte pouze na plochy, které nejsou omývány vodou nebo deštěm.

Přípravek neaplikujte do nebo v blízkosti odpadů či kanalizace.

Přípravek neaplikujte na místa s častým čištěním, kde hrozí odstranění gelové nástrahy.

Přípravek neaplikujte na povrchy, jejichž teplota může přesáhnout 50 °C, kdy gel zkapalní a ztratí svoji účinnost, např. části kamen, trouby, grily, digestoře, sauny, tepelné žárovky, fritézy, myčky a horkovodní potrubí.

Přípravek neaplikujte v místech zvýšeného výskytu ptáků, jejichž potravou mohou být mravenci a kde není zamezen přístup ptáků k nim pomocí sítí apod.

Nástrahu je nutné zakrýt a zajistit tak minimalizaci přístupu necílových organismů.

Spotřebu nástrahy kontrolujte jednou za 7–14 dní a podle potřeby nástrahu aplikujte znovu.

#### 4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Zamezte zasažení pokožky, očí či oděvu.

Po manipulaci s přípravkem se důkladně umyjte vodou a mýdlem.

Při styku s kůží: Omyjte kůži vodou.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezte úniku přípravku do povrchových vod a kanalizace. Přípravek ani jeho obaly nesmí kontaminovat rybníky, vodní toky a příkopy. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Nedovolte, aby přípravek kontaminoval systém podzemních vod.

#### 4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Případné úniky nebo přebytečné množství přípravku utřete pomocí papírové utěrky a použitou papírovou utěrku zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Odstraňte nespoteřebovaný přípravek a materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Prázdné dávkovače nedoplňujte ani znovu nepoužívejte.

**Katalogové číslo odpadu EWC:**

20 01 19\* Pesticidy

15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

#### 4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

### 4.3 Popis použití

#### Použití 3 - Profesionální použití - nástrahové staničky

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ přípravku</b>                                                   | Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>        | VII.2 Ochrana zdraví - Insekticidní přípravek s účinnou látkou indoxacarb ve formě gelu v nástrahové staničce určený k regulaci populace mravenců.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b> | Latinský název: Hymenoptera: Formicidae:<br>Obecný název: mravenec obecný (Lasius niger)<br>Vývojové stadium: Žádné informace                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oblast použití</b>                                                  | Vnitřní<br><br>Venkovní<br><br>Pro použití v interiéru i exteriéru. Přípravek je určen pro použití ve vnitřních prostorách a přilehlém okolí obytných budov, kanceláří, průmyslových a komerčních objektů, skladů a veřejných prostor (kuchyně, nemocnice, školy, sociální zařízení, hotely, letiště).                             |
| <b>Metoda(y) aplikace</b>                                              | Metoda: Použití ve formě nástrahy<br>Podrobný popis:<br>Použití ve formě nástrahy. Nástraha k přímému použití je umístěna v nástrahové staničce.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>                           | Míra aplikace: 1-5 nástrahových staniček na 40 m <sup>2</sup><br>Ředění (%): 0<br>Počet a načasování aplikace:<br><br>1 - 5 nástrahových staniček na 40 m <sup>2</sup> do míst, kde jsou mravenci aktivní (max. aplikační dávka: 0,5 g gelové nástrahy na m <sup>2</sup> ).<br><br>Nástrahovou staničku vyměňte nejdříve za 7 dní. |
| <b>Kategorie uživatelů</b>                                             | Široká veřejnost (neprofesionál)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Velikost balení a obalový materiál</b>                              | Plastová (PET,EVOH/PE) nástrahová stanička v tepelně uzavřené fólii obsahující: 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 a 6 gramů gelové nástrahy.                                                                                                                                                                                                      |

#### 4.3.1 Návod k danému způsobu použití

### 4.3.1 Návod k danému způsobu použití

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Před položením nástrahové staničky určete místa aktivity mravenců a stanovte rozsah zamoření. Nástrahovou staničku umístěte v blízkosti mravenišť, přímo na mravenčí stezky nebo na další místa, kde je zvýšený výskyt mravenců či na místa, kde se předpokládá možný zvýšený výskyt mravenců. Přípravek se také aplikuje na místa vstupu škůdců do obytných prostor, do podkroví, do otvorů ve zdech, za skříně a jiná zařízení, za lišty či podél potrubí.

Odstraňte všechny možné zdroje potravy, které jsou pro škůdce snadno dosažitelné.

Venkovní použití (terasy, vstupní prostory a zahrady): umístěte nástrahové staničky do míst, kde je nejpravděpodobnější výskyt mravenců: okapy, římsy, místa vstupu potrubí a drátů do konstrukce budov.

Na konci období ošetření odstraňte nástrahové staničky a bezpečně zlikvidujte, viz kapitola 4.3.4

### 4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Nástrahové staničky neotvírejte a s gelovou nástrahou nemanipulujte.

Přípravek se používá pouze v prostorách nepřístupným dětem, domácím zvířatům a necílovým organismům.

Nepoužívejte v prostorách, kde mohou do styku s přípravkem přijít potraviny nebo krmiva, potravinářské náčiní nebo povrchy pro zpracování potravin, nebo může dojít k jejich kontaminaci.

Při venkovním použití přípravek aplikujte pouze na plochy, které nejsou omývány vodou nebo deštěm.

Při použití kolem budov nepokládejte nástrahové staničky do nebo v blízkosti odpadů či kanalizace.

### 4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Zamezte zasažení pokožky, očí či oděvu.

Po manipulaci s přípravkem se důkladně umyjte vodou a mýdlem.

Při styku s kůží: Omyjte kůži vodou.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezte úniku přípravku do povrchových vod a kanalizace. Přípravek ani jeho obaly nesmí kontaminovat rybníky, vodní toky a příkopy.

**4.3.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití**

Případné úniky nebo přebytečné množství přípravku utřete pomocí papírové utěrky. Odstraňte obal, nespotřebovaný přípravek a materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Prázdné nástrahové staničky nedoplňujte ani znovu nepoužívejte.

**Katalogové číslo odpadu EWC:**

20 01 19\* Pesticidy

15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

**4.3.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití**

viz kapitola 5.5.

## 5. Obecná pravidla pro používání

### 5.1. Pokyny pro používání

viz kapitola 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. Návod k danému způsobu použití

### 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

viz kapitola 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

### 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

viz kapitola 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

### 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

viz kapitola 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

### 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte v původním obalu na uzamčeném a suchém místě, kam nemají přístup děti.  
Chraňte před teplotními extrémy.  
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky

## 6. Další informace

The content of 0.05% refers to the active form ie the S-enantiomer