

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Advion Cockroach Gel

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
(Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0018050-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0018050-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	7

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Advion Cockroach Gel
Gel na šváby Advion

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Syngenta Crop Protection AG
	Adresa	Rosentalstrasse 67 4058 Basel Švýcarsko
Číslo povolení	CZ-0018050-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0018050-0000	
Datum udělení povolení	17/12/2009	
Datum skončení platnosti povolení	30/06/2024	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	American Blending and Filling Laboratories Inc
Adresa výrobce	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Spojené státy
Umístění výrobních závodů	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Spojené státy

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

64 - Indoxakarb (reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25)

Název výrobce

DuPont Crop Protection Products

Adresa výrobce

Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Spojené státy

Umístění výrobních závodů

Mobile Manufacturing Center, Highway 43 36505, Alabama Axis Spojené státy

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Indoxakarb (reakční směs enantiomerů (S) a (R) v poměru 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	účinná látka			0,6

2.2. Typ složení přípravku

RB - Nástraha k přímému použití

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje indoxakarb. Může vyvolat alergickou reakci.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Insekticid - odborně způsobilá osoba (profesionální použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců
(Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Přípravek ve formě gelu určený jako nástraha proti švábům a rusům k přímému použití za účelem ochrany zdraví.
Pro použití v interiéru i exteriéru.
Používá se k ošetření štěrbin, spár a bodovému ošetření, a to pouze uvnitř obytných domů, průmyslových objektů, kanceláří, skladů, velkokuchyní, nemocnic, škol, domovů důchodců, hotelů, autobusů, vlaků, letadel a maloobchodních i velkoobchodních zařízení a v okolí těchto objektů.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: *Periplaneta americana*
Obecný název: šváb americký
Vývojové stadium: dospělci a nymfy

Latinský název: *Blattella germanica*
Obecný název: rus domácí
Vývojové stadium: dospělci a nymfy

Latinský název: *Blatta orientalis*
Obecný název: šváb obecný
Vývojové stadium: dospělci a nymfy

Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Používá se k ošetření štěrbin, spár a bodovému ošetření, a to pouze uvnitř obytných domů, průmyslových objektů, kanceláří, skladů, velkokuchyní, nemocnic, škol, domovů důchodců, hotelů, autobusů, vlaků, letadel a maloobchodních i velkoobchodních zařízení a v okolí těchto objektů.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Použití ve formě nástrahy
Podrobný popis:
Použití ve formě nástrahy.

Přípravek se aplikuje jako volná nástraha do míst nepřístupným dětem, domácím zvířatům a necílovým organismům, nebo do nástrahových staniček.

Gel se aplikuje z dávkovače, který může být osazen různými dávkovacími tryskami pro dávkování návnad různé velikosti a tvarů. V prostorech určených pro manipulaci s potravinami nebo krmivy se ošetřují pouze štěrby a spáry.

Aplikujte nejméně 2 plošky gelu na m²

Při vysokém zamoření šváby (případně vysokém výskytu švába amerického a švába obecného) lze aplikovat až 5 plošek na 1 m².

Upozornění:

- ploška o průměru 5 mm váží přibližně 0,1 g

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

- ploška o průměru 10 mm váží přibližně 0,5 g
- tenký proužek o délce 5 cm a šířce 3 cm váží přibližně 0,35 g

Míra aplikace: 0,2–0,5 g/m²
Ředění (%): 0
Počet a načasování aplikace:
Aplikujte nejméně 2 plošky gelu na m²

Při vysokém zamoření šváby (případně vysokém výskytu švába amerického a švába obecného) lze aplikovat až 5 plošek na 1 m².

Upozornění:

- ploška o průměru 5 mm váží přibližně 0,1 g
- ploška o průměru 10 mm váží přibližně 0,5 g
- tenký proužek o délce 5 cm a šířce 3 cm váží přibližně 0,35 g

Spotřebu nástrahy kontrolujte jednou za 7–14 dní a podle potřeby nástrahu aplikujte znovu.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Dávkovač z HDPE o obsahu nástrahy 30 g.

Přípravek se dodává v předem naplněných dávkovačích s pístem a šroubovacím uzávěrem obsahujících 30 g nástrahy. Balení obsahuje 4 dávkovače s přípravkem o celkové hmotnosti 120 g.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Pouze pro použití odborně způsobilou osobou.

Přípravek se používá pouze v prostorách nepřístupným dětem, domácím zvířatům a necílovým organismům.
Nepoužívejte uvnitř kanalizačních potrubí ani v jejich okolí.

Nepoužívejte v prostorách, kde mohou do styku s přípravkem přijít potraviny nebo krmiva, potravinářské náčiní nebo povrchy pro zpracování potravin, nebo může dojít k jejich kontaminaci.

Nepoužívejte v prostorách, které se pravidelně čistí a kde by tím došlo k odstranění gelové nástrahy.
Při venkovním použití přípravku aplikujte pouze na plochy, které nejsou omývány vodou nebo deštěm.
Nástrahu je nutné zakrýt a zajistit tak minimalizaci přístupu necílových organismů.
Přípravek se nesmí aplikovat na povrchy, jejichž teplota může přesáhnout 50 °C, kdy gel kapalní a svoji účinnost, např. části kamen, trouby, grily, digestoře, sauny, tepelné žárovky, fritézy, myčky a horkovodní potrubí.
Přípravek neaplikujte na místa s častým čištěním, kde hrozí odstranění gelové nástrahy.
Spotřebu nástrahy kontrolujte jednou za 7–14 dní a podle potřeby nástrahu aplikujte znovu.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Případné úniky nebo přebytky množství přípravku utřete pomocí papírové utěrky a použitou papírovou utěrku zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Zamezte zasažení pokožky, zraku či oděvu.
Po manipulaci s přípravkem se důkladně umyjte vodou a mýdlem.
Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Nedovolte, aby přípravek kontaminoval systém podzemních vod.
Nenechte přípravek uniknout do povrchových vod nebo kanalizace.
Případné úniky nebo přebytky množství přípravku utřete pomocí papírové utěrky a použitou papírovou utěrku zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Odstraňte obal, nespotřebovaný přípravek a materiály kontaminované přípravkem jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.
Nepoužitý přípravek nesmí být vypuštěn do kanalizace.
Prázdné dávkovače nedoplňujte ani znovu nepoužívejte.

Katalogové číslo odpadu EWC:
20 01 19* Pesticidy
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Skladujte v původním obalu na uzamčeném a suchém místě, kam nemají přístup děti.
Chraňte před teplotními extrémy.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Žádná zvláštní omezení skladování společně s jinými výrobky.
Doba použitelnosti přípravku: 2 roky

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

viz kapitola 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

viz kapitola 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

viz kapitola 4.1.3 Pro daný způsob použití, údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

viz kapitola 4.1.4 Pro daný způsob použití, pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

viz kapitola 4.1.5 Pro daný způsob použití, podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování.

6. Další informace

Při používání přípravku je nutné aplikovat mechanismy zabránění vzniku potenciální rezistence hmyzu vůči přípravku, ať už fyziologické nebo behaviorální.
Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.